



ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №52



Российский университет
дружбы народов

ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ЖИЗНИ. 2016

К ВОПРОСУ ДЛИТЕЛЬНОЙ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

А.Ю. Буланов

г. Москва

Варфарин

- В высокой степени подвержен лекарственным взаимодействиям
- В высокой степени зависит от диеты
- Зависит от индивидуальной восприимчивости
- Зависит от функции печени
- Гиперкоагуляция в начале приема

- **Venous thromboembolism in lymphoma: how effectively are we treating patients?**

A.A. Maslimani, T.P. Spiro, A.A. Chaudhry et al., 2009

...Терапия тромбозов у больных лимфомами с применением варфарина осложнилась рецидивами тромбоза в 30,4% случаев, кровотечениями в 13%, против 9% и 0 при использовании НМГ...

Прямые ингибиторы

Первое впечатление

Эффективные
анти тромботические средства



Пероральная форма: нет
необходимости
в венозном доступе



«Стандартная» фармакокинетика



Не нужны лабораторные контроль



Нет геморрагических осложнений



2016


Прямые ингибиторы



Первое впечатление		Близкое знакомство	
Эффективные антитромботические средства			Эффективные антитромботические средства
Пероральная форма: нет необходимости в венозном доступе			При нарушении функции ЖКК использование не возможно
«Стандартная» фармакокинетика			Фармакокинетика зависит от функции почек, печени, веса, возраста
Не нужны лабораторные контроль			Нет надежных методов контроля
Нет геморрагических осложнений			Накоплена статистика геморрагических осложнений
			Нет антидота

«Рутинные» тесты в контроле прямых ингибиторов



	ПВ	АЧТВ	ТВ	Анти Па	Анти Ха
Дабигатран	-	↑	↑↑	↑↑	-
Ривароксабан	↑	↑	-	-	↑↑

Тромбоэластограмма





ТЭГ: эффект ривароксабана



Анти-Ха-активность 0,68 МЕ/мл

Анти-Ха-активность 0,91 МЕ/мл

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!